




БАНСЬКИЙ, БІЛОШАПОТІНСЬКИЙ, ТУКАЛО-ЯСЕНІВСЬКИЙ ПРОЯВИ

Рудопрояви золота Банський, Білопотіський, Тукало-Ясенівський знаходяться у Рахівському районі Закарпатської області та приурочені до північно-західної частини Мармарошського кристалічного масиву Карпат.

Рудопрояви золота пов'язані з субмеридіональними крутопадаючими зонами тріщинуватості. Групуючись просторово вони утворюють дві зони окварцювання серед відкладів кембрійського віку:

- західну – рудопрояр Банський;
- східну – рудопрояви Білопотіський, Ясенів, Тукало.



Західна зона оконтурена первинним ореолом золота 0,01 г/т завдовжки 1600 м з півночі на південь, при середній ширині 200-300 м. Вертикально золоторудна мінералізація простежена на 300 м.

Східна зона оконтурена первинним ореолом золота 0,01 г/т завдовжки 2500 м з півночі на південь, при середній ширині 300-500 м. Вертикально золоторудна мінералізація простежена на 600 м.

Золоторудна мінералізація пов'язана з кварцовими жилами, прожилками, лінзами. Вміст золота в рудних тілах становить від перших г/т (1-2) до 50-77г/т в окремих пробах (в середньому – 5 г/т), срібло – в середньому 3,5 г/т.

Загальний ресурсний потенціал на трьох перспективних ділянках становить по категоріях $C_2+P_1+P_2+P_3$ – ,близько 60 у.од.